

OCHRONA PLANTACJI BURAKA CUKROWEGO 2019



ZWALCZANIE CHWASTÓW

Dwuliścienne

<i>Herbicydy</i>	<i>Substancje aktywne</i>	<i>Dawki dzielone (na 1 ha)</i>
Belvedere Forte 400 SE	fenmedifam+desmedifam+etofumesat	1,0 l
Beetup Trio 180 SC	fenmedifam+desmedifam+etofumesat	do 1,5 l
Beta 274 EC	fenmedifam+desmedifam+etofumesat	1,0+1,60 l
Betanal Elite 274 EC	fenmedifam+desmedifam+etofumesat	1,0+1,60 l
Betanal MaxxPro 209 OD	fenmedifam+desmedifam+etofumesat+lenacyl	1,25+1,50 l
Beetup Compact 160 EC	fenmedifam+desmedifam	1,0+2,0 l
Kemifam Super Kon. 320 EC	fenmedifam+desmedifam	1,0 l
Powertwin 400 SC	fenmedifam+etofumesat	max. 1,0 l
Corzal 157 SE	fenmedifam	do 2,5 l; max. 2 zabiegi
Goltix-S 700SC	metamitron	0,8+2,0 l
Jupiter 700 SC	metamitron	1,0+1,50 l
Goltix Titan 565 SC	metamitron+chinomerak	do 2,0 l
Oblix MT 500 SC	metamitron+etofumesat	1,5+2,0 l
Torero 500SC	metamitron+etofumesat	2,0 l
Ethofol 500 SC	etofumesat	max. do 2,0 l; tylko 1 zabieg
Etos 500 SC	etofumesat	max. do 0,2 l
Kemiron Kon. 500 SC	etofumesat	0,2 l
Pyramin Turbo 520 SC	chlorydazon	1,5 l; nalistnie
Kosynier 420 EC	chlorydazon+chinomerak	1,0+1,5 l
Vivendi 300 SL Cliophar 300 SL Lontrel 300 SL Major 300 SL	chlorypyralid	0,3+0,4 l; burak w fazie 2-4 lisci właściwych
Safari 50 WG	trifluszulfuron metylu	do 30 g
Venzar 500 SC	lenacyl	0,5 l

<i>Substancje aktywne</i>	<i>Spektrum zwalczanych chwastów</i>	<i>Działanie</i>
Fenmedifam	Gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, łoboda rozłożysta, rzodkiew świrzepa, tasznik pospolity, tobołki polne	Nalistne
Desmedifam	Chwasty jak wyżej, plus komosa biała i szarłat szorstki	Nalistne
Etofumesat	Dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, mleczyk polny i zwyczajny, przytulia czepna, sporek polny, szarłat szorstki	Doglebowe
Chlorydazon	Gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa i różowa, komosa biała, mak polny, rumian polny, rzodkiew świrzepa, rdest plamisty i powojowy, sporek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	Doglebowe
Chlorypyralid	Rumiany i rumianki, ostrożeń polny, dojrzałe rośliny	Nalistne
Lenacyl	Dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, mleczyk polny i zwyczajny, mak polny, niezapominajka polna, rdest kolankowy i powojowy, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, zioć polny	Doglebowe
Metamitron	Chaber bławatek, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnoty, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik polny, psianka czarna, rdest plamisty, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa	Doglebowe
Trifluszulfuron metylu	Blekit pospolity, dymnica pospolita, gorczyca polna, jasnoty, maruna bezwonna, poziomnik szorstki, przetacznik perski, psianka czarna, rdest kolankowy i plamisty, rumian polny, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, wilczomlecz obrotny, żółtlica drobnokwiatowa	Nalistne

Jednoliścienne

<i>Graminicydy</i>	<i>Uwagi</i>	<i>Dawka na 1 ha</i>
Agil-S 100 EC	Chwasty jednoroczne 0,6 l; wieloletnie (perz) 1,25+1,5 l	0,6+1,5 l
Buster 100 EC	Chwasty jednoroczne 0,4+0,5 l lub (Partner 0,7 l+Buster 0,35 l); Perz 1,0+1,5 l lub (Partner 0,7 l+Buster 1,0 l)	0,4+1,5 l
Leopard Extra 05 EC	Chwasty jednoroczne 0,7+1,5 l; wieloletnie 2,0+3,0 l	0,7+3,0 l
Labrador Extra 50 EC	Chwasty wrażliwe 0,75+1,5 l; wieloletnie 1,5+2,0 l	0,75+2,0 l
Select Super 120 EC	Chwasty jednoroczne 0,8 l; wieloletnie 2,0 l	0,8+2,0 l
Targa Super 05 EC	Chwasty jednoroczne 0,75+1,0 l; wieloletnie 1,0+2,0 l	0,75+2,0 l

Chwasty jednoroczne podczas zabiegu powinny być w fazie 3 liści właściwych i nie przekraczać fazy końca krzewienia.
Optymalna faza zwalczania chwastów wieloletnich (perz) 4-6 liści właściwych, tj. 15-25 cm wysokości.



ZWALCZANIE SZKODNIKÓW



<i>Insektycydy</i>	<i>Substancje aktywne</i>	<i>Zwalczane szkodniki</i>	<i>Dawki na 1 ha</i>	<i>Uwagi</i>
Bulldock 025 EC	Beta-cyflutryna (Grupa pyretroidów)	Pchełka burakowa	0,2 l	Działa kontaktowo i żołądkowo.
Danadim 400 EC	Dimetoat (Grupa fosforoorganiczna)	Mszycyca trzmielinowo-burakowa	0,6 l	Działa kontaktowo i żołądkowo, pow.15 st.C.
Markiz 400 EC	Dimetoat (Grupa fosforoorganiczna)	Mszycyca burakowa	0,5 l	Działa kontaktowo i żołądkowo, pow.15 st.C.
Ortus 05 SC	Fenpiroksymat (Grupa fenoksypirazoli)	Przędziorek chmielowiec	1,5÷ 1,8 l	Działa kontaktowo i żołądkowo
Pyrinex 480 SC	Chloropirifos (Grupa fosforoorganiczna)	Śmietka ćwiklanka, pchełka burakowa	1,0 l	Działa kontaktowo, żołądkowo i gazowo.



ZWALCZANIE CHOROÓB GRZYBOWYCH



<i>Fungicydy</i>	<i>Substancje aktywne</i>	<i>Zwalczane choroby</i>	<i>Dawki na 1ha</i>	<i>Uwagi</i>
Dafne 250 EC	Difenokonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka	0,4 l	Okres karencji 62 dni !!!
Duett Star 334 SE	Fenpropimorf (Grupa morfolin) Epoksykonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka, mączniak prawdziwy	1,0 l	Okres karencji 35 dni.
Eminent 125 ME	Tetrazakonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, rdza buraka	1,0 l	Okres karencji 30 dni.
Optan 183 SE	Epoksykonazol (Grupa triazoli) Piraklostrobina (Grupa strobiluryn)	Chwościk buraka	0,5÷0,7 l	Okres karencji 35 dni.
Porter 250 EC	Difenokonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka	0,4 l	Okres karencji 62 dni !!!
Tiptop 500 SC	Tiofanat metylowy (Grupa benzimidazoli)	Chwościk buraka, brunatna plamistość	1,2 l	Okres karencji 14 dni.
Spyrale 475 EC	Fenpropidyna (Grupa morfolin) Difenokonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka	1,0 l	Okres karencji 28 dni.
Tango Star	Fenpropimorf (Grupa morfolin) Epoksykonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści	1,0 L	Okres karencji 35 dni.
Tebu 250 EW	Tebukonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka, mączniak prawdziwy buraka	0,8 l	Okres karencji 30 dni.
Topsin M 500 SC	Tiofanat metylowy (Grupa benzimidazoli)	Chwościk buraka, brunatna plamistość liści	1,2 L	Okres karencji 14 dni.
Yamato 303 SE	Tiofanat metylowy (Grupa benzimidazoli) Tetrazakonazol (Grupa triazoli)	Chwościk buraka	1,25÷1,5 l	Okres karencji 35 dni.

POZOSTAŁE

Asashi SL	Para- i orto-nitrofenolan sodu, 5-nitrowajakolan sodu	Regulator wzrostu	0,6 l x 2 zabiegi w odstępie 20-50 dni
Oleo Max 1000 SL	Olej mineralny SAE 10/95		
Olemix 84 EC	Olej mineralny SAE 10/95		
OLEO 84 EC	Olej		

Triazole stosujemy w temperaturze powietrza powyżej 12°C.

NIE POWTARZAMY w kolejnym zabiegu fungicydowym substancji aktywnej z poprzedniego zabiegu!!!

Zgodnie z art. 68 ustawy o ochronie roślin z 2003 roku, środki ochrony roślin można stosować tylko i wyłącznie zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania i tylko do zwalczania organizmów szkodliwych.



Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada również szeroką gamę pestycydów do innych upraw rolniczych - zapraszamy do Punktów Sprzedaży Detalicznej

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN obowiązująca od 1 stycznia 2014 r. to m.in.

> Umiejętność rozpoznawania gatunków agrofagów, znajomość ich biologii i sposobu zachowania w różnych warunkach pogodowych.
i zaskorupienia gleby.

> Znajomość wrogów naturalnych oraz ich biologii.

> Wiedza o wymaganiach i rozwoju rośliny uprawnej, dostęp do informacji o prognozowanych terminach pojawu organizmu szkodliwego oraz oceny jego nasilenia i dalszego rozwoju.

